

Тема: Некроз, гангрена, виразки, нориці

Після поранення кисті у пацієнта почав утворюватися набряк. Під час якої стадії порушення місцевого кровообігу починається утворення набряку?

Артеріальної гіперемії

Престазу

Спазму артеріол

Венозної гіперемії

Стазу

Під час гострого тромбозу показана антикоагулянтна терапія. Назвіть антикоагулянт прямої дії, який застосовується в разі загрози тромбозу.

Гепарин

Варфарин

Дипіридамол

Фраксипарин

клексан

У чоловіка спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується «переміжною кульгавістю». Оклюзію якої артерії можна припустити?

Підколінної артерії

Проксимальної частини стегнової артерії

Низхідної артерії коліна

Глибокої артерії стегна

Тильної артерії стопи

У хворого на цукровий діабет з'явився різкий біль у правій стопі. При огляді великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася в хворого?

Гангрена волога

Секвестр

Пролежень

Інфаркт

Гангрена суха

До хірурга звернувся чоловік 60-ти років, що тривалий час хворів на цукровий діабет. Тканини правої стопи були чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив хірург?

Суха гангрена

Пролежень

Трофічна виразка

Газова гангрена

Волога гангрена

Жінка 69-ти років довго хворіла на атеросклероз. Надійшла до хірургічного відділення з симптомами гострого живота. В ході лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої?

Волога гангрена

Ішемічний інфаркт

Секвестр

Коагуляційний некроз

Суха гангрена

У пацієнта діагностовано порушення периферичного кровообігу, основою якого є обмеження припливу артеріальної крові. Спостерігається збліднення цієї ділянки та зниження місцевої температури. Яким захворюванням це обумовлено?

Артеріальною гіперемією

Лімфостазом

Ішемією

Сладж-феноменом

Венозною гіперемією

Пацієнту, у якого закритий перелом плечової кістки, накладено гіпсову пов'язку. Наступного дня з'явилися припухлість, синюшність і похолодіння кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?

Ішемія

Емболія

Тромбоз

Артеріальна гіперемія

Венозна гіперемія