

Тема: Кровотечі

В лікарню надійшов хворий з кровотечею внаслідок ножового поранення в ділянці сонного трикутника; кров - темного кольору. Яка судина пошкоджена?

Внутрішня яремна вена

Зовнішня яремна вена

Лицева вена

Внутрішня сонна артерія

Лицева артерія

У хворого кровотеча з поперечної ободової кишки. Чим кровопостається цей відділ товстої кишки?

Arteria colica media

Arteria ileocolica

Arteria mesenterica inferior

Arteria sigmoidea

Arteria lienalis

Жінці 50-ти років, яка хворіє на тромбофлебіт, ввели гепарин, що спровокував кишкову кровотечу. Який препарат потрібно призначити?

Протаміну сульфат

Стрептокіназу

Натрію цитрат

Кислоту амінокапронову

Вікасол

Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш ймовірно вданому випадку?

Стравохідні

Верхні брижові

Нижні брижові

Селезінкові

Печінкові

Чоловіка 49 років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кісток і пошкодження головного мозку не виявлено. При пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого стану потерпілого є

Гіповолемія

Еритропенія

Гіпоінсулінемія

Гіпопротеїнемія

Гіпокатріємія

Лікар-гематолог призначив пацієнту з кровотечею коагулянт, який діє шляхом підвищення синтезу протромбіну та інших факторів зсідання крові переважно в печінці і є синтетичним водорозчинним вітаміном. Який препарат призначив лікар?
Менадіону натрію біосульфат

Тромбін

Кальцію хлорид

Етамзилат

Гепарин