

Тема : Операція. Перед та післяопераційний період

Після введення місцевого анестетика у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який механізм порушення кровообігу є провідним у цьому разі?

Зниження тону судин

Підвищення тону судин

Зниження скоротливої функції серця

Гіперволеція

Активація симпатико-адреналової системи

Який препарат необхідно застосувати як антидот у разі отруєння наркотичними анальгетиками?

Налоксон

Тіосульфат натрію

Адреналіну гідрохлорид

Протаміну сульфат

Унітіол

Хворому перед екстракцією зуба була проведена провідникова анестезія лідокаїном, після введення якого з'явилися набряк і гіперемія навколо місця уколу, свербіння шкіри, загальна слабкість, гіпотензія, рухове збудження. Визначте, як називається ускладнення, що виникло:

Алергічна реакція

Тахіфілаксія

Толерантність

Токсична дія

Лікарська залежність

У хворого після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби перистальтика кишечника не відновилася. Який лікарський засіб доцільно призначити хворому для відновлення моторики?

Прозерин

Гігроній

Метилурацил

Атенолол

Резерпін

До лікарні надійшов пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очередини хірург під час операції повинен ретельно обстежити?

Чепцева сумка

Передшлункова сумка

Лівий бічний канал

Права брижова пазуха

Печінкова сумка

До лікарні поступив пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини під час операції хірург повинен ретельно обстежити?

Чепцеву сумку

Передшлункову сумку

Лівий бічний канал

Праву брижову пазуху

Печінкову сумку

Під час проведення місцевого знеболення у пацієнта виник анафілактичний шок. Який із нижченаведених препаратів треба ввести хворому?

Адреналіну гідрохлорид

Супрастин

Діазепам

Атропіну сульфат

Преднізолон

Пацієнту віком 35 років під час хірургічного втручання ввели препарат із групи деполаризуючих міорелаксантів. Укажіть, який засіб було введено.

Дитилін

Прозерин

Аміназин

Рокуроній

Атракуріум