

Тема: Пухлини. Трансплантологія.

У пацієнта зі встановленим діагнозом: СНІД, на нижній кінцівці виявлено пухлину, що злегка підіймається над шкірою, є безболісними плямами. Гістологічно для видаленої пухлини характерні незавершений ангиогенез, проліферація веретеноподібних клітин, що утворюють пучки, які хаотично переплітаються і розростання грануляційної тканини різного ступеня зрілості з інфільтрацією імунокомпетентними клітинами. Васкулярні проліферати оточені набряклою рихлою сполучною тканиною, наявні відкладення гемосидерину. Який найімовірніший діагноз?

Саркома Капоши

Фібросаркома

Злоякісна перицитома

Гемангіоендотеліома

Ангіофібросаркома

У пацієнтки на поверхні шкіри лівого кута лопатки знайдено утвір з наступними характеристиками: 5-7 мм діаметром, кулястої форми, твердої консистенції, який має широку основу та сосочкову поверхню. Гістологічно: клітини плоского епітелію, що нерівномірно розростаються, кількість шарів збільшена, надлишкова кількість кровоносних судин. Вкажіть патологічний процес:

Папілома

Аденокарцинома

Гідроаденома

«Рак на місці»

Аденома

У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?

Між верхньою і нижньою надчеревними венами

Між хребетними і пупковими венами

Між непарною і напівнепарною венами

Між пупковою і верхньою надчеревною венами

Між верхніми і нижніми прямокишковими венами

Під час дослідження стегнової кістки виявлено хронічне гнійне запалення компактної речовини та кісткового мозку, а також утворення секвестрів. При якому захворюванні розвиваються такі зміни?

Остеобластокластома

Ретикулосаркома

Періостит

Остеомієліт

Мієломна хвороба

У клініці хворому було пересаджено нирку. Які з перерахованих клітин імунної системи можуть безпосередньо впливати на клітини трансплантату?

Т-кілери

Т-хелпери

Тимоцити

Плазмобласти

В-лімфоцити

У жінки, хворої на злоякісну пухлину молочної залози, лікар виявив збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. Яка група вузлів підлягає ураженню при даній патології в першу чергу?

Пахвові вузли

Діафрагмальні вузли

Шийні вузли

Ліктьові вузли

Пахвинні вузли