

Тема: Трансфузіологія

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резус-позитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0 $\alpha\beta$ (I), A β (II), B α (III). Досліджувана кров належить до групи:

0 $\alpha\beta$ (I)

B α (III)

-

A β (II)

AB (IV)

Під час визначення групової належності крові за системою AB0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?

B (III) альфа

A (II) бета

0 (I) альфа, бета

Неможливо визначити

AB (IV)

У жінки під час пологів в зв'язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп O (I), A (II) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи B (III). Досліджувана кров належить до групи

B (III)

A (II)

AB (IV)

O (I)

-

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (I), A (II), B (III). Досліджувана кров належить до групи:

0 (I)

B (III)

AB (IV)

A (II)

Неможливо визначити

У крові резус-негативної жінки під час вагітності виявлені специфічні білки, здатні руйнувати резус-позитивні еритроцити плода. Як називається цей захисний компонент організму матері?

Антитіло

Фактор некрозу пухлини

Резус-фактор

Гормон

Сироватка

У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (I), A (II), B (III). Досліджувана кров належить до групи:

0 (I)

B (III)

A (II)

AB (IV)

Неможливо визначити

Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (B) Rh(+). Якого донора треба вибрати?

III (B) Rh(+)

II (A) Rh(+)

III (B) Rh(-)

I(0) Rh(-)

IV (AB) Rh(-)