

Тема: Травма

Чоловіка 49-ти років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кісток і пошкодження головного мозку не виявлено. При пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого стану потерпілого є:

- Гіповолемія
- Еритропенія
- Гіпопротеїнемія
- Гіпонатріємія
- Гіпоінсулінемія

У хворого після травми втрачена чутливість шкіри на долонній поверхні 5-го пальця лівої кисті. Який нерв пошкоджений?

- N. ulnaris
- N. radialis
- N. medianus
- N. axillaris
- N. musculo-cutaneus

До травматологічного відділення потрапив потерпілий із травмою зап'ястка та клінікою ушкодження нерва, що проходить у каналі зап'ястка. Який це нерв?

- N. medianus
- N. ulnaris
- N. axillaris
- N. musculocutaneus
- N. radialis

У потерпілого виявлено ножове поранення м'язів передньої стінки пахвової ямки. Які м'язи грудної клітки формують цю стінку?

- M. pectoralis minor, m. pectoralis major
- M. serratus anterior, m. subclavius
- M. serratus anterior, m. pectoralis major
- M. serratus anterior, m. pectoralis minor
- M. pectoralis minor, m. subclavius

Пацієнту, у якого закритий перелом плечової кістки, накладено гіпсову пов'язку. Наступного дня з'явилися припухлість, синюшність і похолодіння кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?

- Ішемія
- Емболія
- Тромбоз
- Артеріальна гіперемія
- Венозна гіперемія

У потерпілого спостерігається перелом у ділянці бічної поверхні променево-зап'ясткового суглоба. У якому місці найімовірніше відбувся перелом?

Шилоподібний відросток променевої кістки

Нижня третина плечової кістки

Головчаста кістка

Шилоподібний відросток ліктьової кістки

Гачкувата кістка

До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?

Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота

Міжніжкові волокна

Апоневроз внутрішнього косого м'яза живота

Апоневроз поперечного м'яза живота

Власна фасція живота

У пацієнта травма кульшового суглоба. Рентгенологічно чітко виявлено внутрішньосуглобовий крововилив. Яка зв'язка розірвана?

Lig. capitis femoris

Lig. ischiofemorale

Zona orbicularis

Lig. iliofemorale

Lig. transversum acetabuli

У хворого 40-ка років, доставленого в травматологічне відділення, виявлено поранення правої кисті на долонній поверхні. Під час обстеження травмований не може самостійно звести розведені II, IV та V пальці. Які м'язи пошкоджені?

Долонні міжкісткові

Червоподібні

Короткий долонний

Тильні міжкісткові

Довгий долонний

Водій автомобіля дістав травму грудної клітки внаслідок удару об рульове колесо. Яка з перерахованих артерій найімовірніше може бути ушкодженою?

A. thoracica interna

A. suprascapularis

A. vertebralis

A. subscapularis

A. thyroidea superior

У хворого після травми коліна гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні можна зміщувати вперед і назад подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані?

Схрещені зв'язки коліна
Коса підколінна
Великогомілкова колатеральна
Малогомілкова колатеральна
Поперечна зв'язка коліна

Потерпілому після ДТП ампутовано нижню кінцівку. Упродовж тривалого часу він відчував нестерпний біль в ампутованій кінцівці. Який вид болю виник у пацієнта?

Фантомний
Рефлекторний
Відбитий
Каузалгічний
Вісцеральний