

## Питання КРОК-2 з медицини катастроф

**NB Перша відповідь вірна.**

Мешканці населеного пункту, де сталось стихійне лихо, в 11 годині ранку розпочали пересування пішки до прихистку. У характеристиці погодних умов спостерігається: літній день із помірною хмарністю, температура повітря 33 °С, відносна вологість повітря 63%, швидкість руху повітря 0,7 м/с. Через 2 години у частини біженців з'явилися запаморочення, нудота, гіперемія шкірних покривів, прискорене дихання та загальна слабкість, головний біль та підвищення температури тіла до 40 °С. Укажіть основну причину появи порушень стану здоров'я у потерпілих.

Тепловий удар

Недостатність тренувальної підготовки

Голод

Перевтома

Нервово-психічне перенапруження

Бригада екстреної швидкої медичної допомоги прибула на місце ДТП через 4 хвилини і виявили п'ять потерпілих. Проведіть медичне сортування та визначте черговість надання медичної допомоги. Кому з нижче перерахованих потерпілих в першу чергу буде надана медична допомога?

водій другого автомобіля, чоловік 55 років, ударився об вітрове скло, не ворухнувшись, його стан розцінено, як клінічна смерть

пасажир другого автомобіля чоловік 57 років скаржиться на біль в ділянці правого стегна, на правій штанині виступили бурі плями середнього розміру, не збільшується у розмірі

другий пасажир першого автомобіля, хлопчик 6 років, з пошкоджень виявлено множинні рвані рани обличчя

водій першого автомобіля чоловік 32 років, вдарився об кермо, скаржиться на біль в ділянці грудей

пасажир першого автомобіля, вагітна жінка 27 років, дещо збуджена, скаржиться на біль в ділянці правого плеча, інших пошкоджень не виявлено

В оперативно-диспетчерську службу Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф зателефонував житель міста. Скаржився на загрудинний біль стискальського характеру з іррадіацією в ліву руку. Біль не знімається нітрогліцерином. Вкажіть термін прибуття бригади екстреної медичної допомоги у цьому випадку:

10 хвилин з моменту звернення

30 хвилин з моменту звернення

20 хвилин з моменту звернення

15 хвилин з моменту звернення

60 хвилин з моменту звернення

Чоловік 35 років збитий автомобілем, ударився головою об асфальт. Об'єктивно встановлено: стан важкий, без свідомості, у комі, дихання уривчасте, шумне, на больові подразники не реагує. У ділянці лоба велика рана м'яких тканин голови, видно фрагменти кістки, витікає мозковий детрит, є кровотеча. Визначте лікувальну тактику на догоспітальному етапі:

Зупинка кровотечі, асептична пов'язка

Видалення фрагментів кісток

Зашивання рани

Видалення мозкового детриту

Протинабрякова терапія

Пацієнт віком 47 років отримав опік полум'ям верхніх кінцівок та тулуба. Під час шпиталізації спостерігається: стан важкий, свідомість затьмарена, лихоманка, АТ - 80/50 мм рт. ст., пульс - 118/хв. Місцево констатовано опіки ІІІБ ступеня площею 20%. Які лікувальні заходи необхідно провести насамперед?

Увести наркотичні анальгетики, почати інфузійну терапію

Провести первинну хірургічну обробку опікової рани

Призначити дезінтоксикаційну терапію

Провести некротомию опікової поверхні, гемотрансфузію

Призначити антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію

Ви стали свідком ДТП. Під час огляду місця події побачили чоловіка приблизно 30-ти років, який був збитий автомобілем. Без свідомості. На шиї зліва наявна рясна кровотеча, яскраво-червоного кольору. Яким чином необхідно зупиняти кровотечу?

Пальцеве притиснення, метод Мікуліча

Накласти шину на шию

Максимальне перерозгинання шиї

Перевести в стабільне положення

Накласти гіпсову пов'язку

У пацієнта під час огляду виявлено: наявність рваної рани в ділянці правої гомілки, з якої постійно витікає темна кров. Яку невідкладну допомогу необхідно надати?

Накласти тиснучу пов'язку

Накласти джгут нижче рани

Накласти джгут вище рани

Імобілізувати кінцівку

Прикласти холод до рани