

Тема: Гострі та хронічні хірургічні специфічні захворювання

До хірургічного відділення ЦРЛ надійшов хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики правця?

- Антитоксична сироватка
- Протиправцева вакцина
- Анатоксин
- Антибіотики
- Вакцина АКДП

В лікарню надійшов потерпілий з рваною раною гомілки, яка виникла внаслідок того, що його покусала хвора на сказ тварина. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?

- Антирабічна вакцина
- АДП
- АКДП
- ТАВте
- БЦЖ

Пацієнтові, що звернувся до травмпункту у зв'язку з травмою, отриманою під час роботи на присадибній ділянці, лікар призначив введення правцевого анатоксину. Який імунітет сформується у даного пацієнта після введення препарату?

- Антитоксичний активний
- Нестерильний
- Антитоксичний пасивний
- Антимікробний пасивний
- Антимікробний активний

До хірургічного відділення ЦРЛ надійшов хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики правця?

- Антитоксична сироватка
- Протиправцева вакцина
- Вакцина АКДП
- Анатоксин
- Антибіотики

Чоловікові для введення лікувальної дози протиправцевої сироватки було зроблено пробу на чутливість, яка виявилась позитивною. Специфічну гіпосенсибілізацію хворому найправильніше провести введенням:

- Малих доз протиправцевої сироватки
- Імунодепресантів
- Дозованої дози протиправцевої сироватки
- Глюкокортикоїдів

Антигістамінних препаратів

У хірургічне відділення лікарні був прийнятий хворий з підозрою на абсцес печінки. Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і неоднаразово хворів на гостре шлунково-кишкове захворювання. Яке протозойне захворювання може бути в хворого?

Амебіаз

Лейшманіоз

Трипаносомоз

Токсоплазмоз

Малярія

На фельдшерський пункт звернулась жінка з приводу рваної рани правої кисті, що була спричинена власним мисливським собакою, який загинув через 5 днів від сказу. Які препарати потрібно використати для профілактики сказу у вкушеної жінки?

Антирабічна вакцина+антирабічний імуноглобулін

Інтерферон

Антирабічна сироватка-і-антибіотики

Антибіотики

Вакцина БЦЖ

Чоловік 40 років, м'ясник, номер від сепсису. На правій щоці його визначається конусоподібний, щільний, темно- червоний інфільтрат 6 см із чорною кірочкою в центрі. Права половина обличчя, шії різко набрякли, щільні. Під час мікроскопічного дослідження в інфільтраті визначається вкрай гостре серозно-геморагічне запалення, у центрі інфільтрату спостерігається некроз епідермісу і підлеглих шарів. Який діагноз поставив патологоанатом?

Сибірка

Фурункул

Флегмона шії

Туляремія

Чума

У сільського жителя на кисті правої руки з'явилася невеличка припухлість, яка набула в центрі чорного кольору. При мікроскопічному дослідженні виявлено великі грампозитивні палички, розташовані ланцюжками. Який мікроорганізм міг спричинити це захворювання?

Bacillus anthracis

Mycobacterium tuberculosis

Bacillus cereus

Clostridium botulinum

Clostridium tetani

Чоловік 32-х років, мешканець сільської місцевості, звернувся до лікаря зі скаргами на наявність болісної припухлості у підщелепній ділянці з утворенням нориці. Під

час огляду хворого лікар виявив інфільтрат, у центрі якого наявна нориця з густим гнійним виділенням з крихтами білого кольору. Під час розтину інфільтрату тканини щільні, жовтувато-зеленого кольору, стільникової будови через множинні дрібні гнійники. Яке захворювання можна припустити?

Актиномікоз

Лепра (проказа)

Сифіліс

Абсцес підщелепної ділянки

Туберкульоз

Чоловік віком 40 років, м'ясник, помер від сепсису. Об'єктивно спостерігається: на правій щоці візуалізується конусоподібний, щільний, томно-червоний інфільтрат 6 см із чорною кірочкою в центрі. Права половина обличчя, шиї різко набряклі, щільні. Під час мікроскопічного дослідження в інфільтраті визначається вкрай гостре серозно-геморагічне запалення, у центрі інфільтрату спостерігається некроз епідермісу і підлеглих шарів. Який найімовірніший діагноз?

Сибірка

Туляремія

Чума

Флегмона шиї

Фурункул

У чоловіка віком 72 роки спостерігається збільшення та деформація правого колінного суглоба. Під час гістологічного дослідження тканин суглоба та прилеглих ділянок виявлено, масивні вогнища казеозного некрозу, оточені валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин із наявністю гігантських макрофагів. Який найімовірніший діагноз?

Туберкульозний артрит

Ревматоїдний артрит

Гонорейний артрит

Сифілітичний артрит

Деформуючий остеоартроз

У зв'язку зі спалахом дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення. Який препарат потрібно використати для створення штучного активного імунітету?

Дифтерійний анатоксин

Вакцину АКДП

Специфічний імуноглобулін

Антидифтерійну сироватку

Вакцину з вбитих бактерій

